

登録速報 (適用拡大)

農薬名：オリゼメートリディア箱粒剤

登録番号：第24403号

適用拡大登録日：2022年7月6日

適用拡大登録内容

農薬登録申請書第6項において、

- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用量に「高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」に「イナゴ類」を追加する。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イナゴ類	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植 3日前～ 移植 当日	1回	育苗箱の苗の上から均一に散布する。	3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)
		高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)					

※当該変更に伴い、農薬登録申請書第7項を以下のとおりに変更する。

7 農薬の使用上の注意事項

- (1) 育苗箱の苗の上から所定薬量を均一に散布し、茎葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植すること。
- (2) 薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理を行うこと。
- (3) 育苗箱（30×60×3 cm、使用土壌約 5L）1 箱当りに乾粉として 200 から 300g 程度を高密度には種する場合は、10a 当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が 1kg/10a までとなるよう、育苗箱 1 箱当りの薬量を 50 から 100g までの範囲で調整すること。
- (4) 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などでは薬害を生じるおそれがあるので、必ず健苗に使用すること。
- (5) 稲苗の葉がぬれていると、薬剤が付着して薬害を生じる場合もあるので、散布直前の灌水はさけること。
- (6) 処理苗を移植する本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後に田面が露出しないよう注意すること。
- (7) 処理苗を本田に移植した後は、そのまま湛水状態（湛水深 3～5cm）を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意すること。
- (8) 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟有機物多用田での使用はさけること。
- (9) 移植後、低温が続き、苗の活着遅延が予想される場合には使用をさけること。
- (10) 本剤は処理を誤ると、生育初期の葉の黄化や生育遅延などの薬害を生じるので、所定の使用時期、使用方法を守ること。
- (11) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。