

水稻育苗箱専用殺虫剤

明治

フェルテラ[®] チェス[®] 箱粒剤

クロラントラニリプロール..... 0.75%
ピメトロジン..... 3.0 %
鉱物質微粉等..... 96.25 %

農林水産省登録 第 24161 号

毒性 普通物 有効年限 3年 包装 1kg × 12袋

●特 長

1. フェルテラ(クロラントラニリプロール)は、コブノメイガ、フタオビコヤガ、イネツトムシなどのチョウ目害虫と、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、ツマグロヨコバイに対して高い効果を発揮します。
2. チェス(ピメトロジン)は、ウンカ類に対して高い効果を発揮します。特にウンカ類の吸汁阻害と産卵抑制作用により、次世代の密度を抑制することで長期間効果を持続します。

●適用病害虫および使用方法


作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	ピメトロジンを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ コブノメイガ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	育苗箱 (30× 60×3cm、 使用土壌 約5ℓ) 1箱当たり 50g	は種時 (覆土前) ┆ 移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する。	1回	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田では 2回以内)
	フタオビコヤガ イネツトムシ	移植3日前 ┆ 移植当日					

(平成30年11月現在の登録内容)

●使用上の注意事項

- 育苗箱の上から均一に散布し、軽く灌水してから移植する。
- 本剤処理後に急激な乾燥が起りやすい場所や温度変化が大きい場所で育苗した場合、薬害が生じるおそれがあるので、注意する。
- 本剤処理後の低温で薬害を生じるおそれがあるので温度管理に注意し、適切な育苗に努める。
- 本剤処理後に移植適期を過ぎると薬害を助長させるおそれがあるので、適期の移植に努める。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

●安全使用上の注意

- 誤食などのないよう注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。 

魚毒性等…河川、養殖池に流入しないよう水管理に注意する(甲殻類)。
散布器具及び容器の洗浄は、河川等に流さない。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管…直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。