

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサミルを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	ジヤカ [®] イロシトセンチュウ ジヤカ [®] イロシトセンチュウ	30kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	1回
	ネグ [®] サレセンチュウ	20kg/10a			植溝処理土壌混和	
	アブラムシ類					
ピーマン	シキイロザミマ	1~2.5g/株	育苗期		株元処理	2回以内 (育苗期の株元処理は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内)
	アブラムシ類	1.5~2.5g/株	定植前		全面土壌混和	
	ネゴ [®] センチュウ	50kg/10a	定植前		株元処理	
メロン(地床)	シキイロザミマ	1~2.5g/株	育苗期		株元処理	
メロン(揚床)		1g/株				
メロン	ネゴ [®] センチュウ	40~50kg/10a	定植前		全面土壌混和	
きゅうり	ネゴ [®] センチュウ ネグ [®] サレセンチュウ	25~50kg/10a	は種前又は定植前		株元処理	
	アブラムシ類		定植前			
	シキイロザミマ	1~2.5g/株	育苗期			
すいか	ネゴ [®] センチュウ ネグ [®] サレセンチュウ	25~35kg/10a	は種前又は定植前	全面土壌混和		
	シキイロザミマ	1~2.5g/株	育苗期	株元処理		
	アブラムシ類	1.5~2.5g/株				
にがうり	ネゴ [®] センチュウ	40kg/10a	定植前	全面土壌混和		
レタス	ネゴ [®] センチュウ ネグ [®] サレセンチュウ	40~50kg/10a	定植前			
リーフレタス		40kg/10a	定植前 但し、収穫75日前まで			
トマト ミニトマト		25~50kg/10a	定植前			
だいこん	ネゴ [®] センチュウ アブラムシ類	20~50kg/10a	は種前			
	ネグ [®] サレセンチュウ					
にんにく	イモグ [®] サレセンチュウ	30~50kg/10a	植付前			
にんじん	ネゴ [®] センチュウ ネグ [®] サレセンチュウ	20~50kg/10a	は種前		播溝土壌混和	
ごぼう		20~37kg/10a				
もりあざみ		40~50kg/10a				
かんしょ	ネゴ [®] センチュウ	30~40kg/10a	植付前 (挿苗前)	全面土壌混和		
		40~50kg/10a	植付前	作条土壌混和		
やまのいも	ネゴ [®] センチュウ	40~50kg/10a	植付前	全面土壌混和		

2023年8月23日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カリミルを含む農薬の総使用回数
あずき	ダイズシストセンチュウ	6kg/10a	は種前	1回	作条土壌混和	1回
		30kg/10a			全面土壌混和	
だいず		6kg/10a	は種前又は定植前		作条土壌混和	
		30kg/10a	は種前		全面土壌混和	
えだまめ		6kg/10a	は種前又は定植前		作条土壌混和	
		30kg/10a			全面土壌混和	
たばこ	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	37kg/10a	定植前	作条土壌混和		