


三井東圧

浸透移行性殺虫剤



アルパリン®

顆粒水溶剤



農林水産省「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に掲載された農業です。

アルパリンはアグロ カネシヨウ株式会社の登録商標です。



【作物名の統合】

- 「うり類(漬物用、ただし、とうがンを除く)」「とうがん」は「うり類(漬物用)」に包含されました。
- 「なばな類」は「非結球あぶらな科葉菜類」に包含されました。

(2020年11月11日、2021年12月22日の拡大登録内容より抜粋)

果樹・野菜・水稲・茶・花きの多様な場面で活躍します!

■適用害虫及び使用方法(水稲・果樹・茶・さとうきび・てんさい・だいず・あずき・えだまめ・花き・樹木類・いぐさ・水田作物・畑作物(休耕田)・いね科牧草)

(2021年12月22日の拡大登録内容を含む)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
稲	カメムシ類	2000	60~150ℓ/10a	7日前			4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000					
りんご	アブラムシ類 キンモンボンガ シンクイムシ類 ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類	2000		前日	3回以内	散布	3回以内
	もも ネクタリン						
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類				2回以内		2回以内
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 チュウコクナシキジラミ	2000		前日	3回以内	散布	3回以内
	かき	カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ アザミウマ類					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ						
小粒核果類	アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類		200~700ℓ/10a	前日	3回以内	散布	3回以内
ぶどう	カメムシ類 ブドウトラカミキリ フタテンヒメヨコバイ	3000					
かんきつ	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000~2000		前日	3回以内	散布	3回以内
	ゴマダラカミキリ アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 ミカンバエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノミドリヒメヨコバイ アオバハゴロモ	1000					
あけび(果実)	カメムシ類			14日	2回以内		2回以内
キウイフルーツ	カメムシ類	1000~2000		前日	3回以内		3回以内
びわ	カメムシ類 ヒワキジラミ	2000		前日	2回以内		2回以内
オリーブ	カメムシ類						
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	50	100mℓ/株	育苗期	5回以内	株元灌注	5回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
茶	チャノボンガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ コミカンアブラムシ	2000	200~400ℓ/10a	摘採7日	2回以内		2回以内
さとうきび	アブラムシ類 カンジャコバネナガカメムシ サトウキビチビアザミウマ		100~300ℓ/10a	7日	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水剤は合計3回以内)
てんさい	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ	2000~3000 1000~2000			2回以内		
	だいず	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ テンサイヒハムシ	100~200	5ℓ/ペーパーポット6冊(2.5ℓ/m ²)	移植前	1回	灌注
あずき		アブラムシ類	100~240				
えだまめ	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 ハモグリバエ類 フタスジヒメハムシ	2000	100~300ℓ/10a	7日	3回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
	花き類・観葉植物(きくを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類					
きく	アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類 ハモグリバエ類	2000~3000 2000	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	樹木類(つつじ類、つばき類を除く)	ケムシ類					
つばき類	チャドクガ	100	0.5~2ℓ/樹(但し、220ℓ/10aまで)	2回以内	2回以内	株元灌注	5回以内 (株元灌注は2回以内)
つつじ類	ツツジグンバイ ケムシ類	2000	100~300ℓ/10a	5回以内	5回以内		5回以内
いぐさ	イグサシジミシガ	1000	100~150ℓ/10a	2回以内	2回以内		2回以内
水田作物、畑作物(休耕田)*	カメムシ類	2000	60~150ℓ/10a	-	3回以内		3回以内
いね科牧草	アブラムシ類		100~300ℓ/10a	7日			

★ヨシ、オギ、スキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
かき	コナカイガラムシ類	20~40g/樹	発芽前~発芽期	1回	本剤1g当り水1mℓの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。	4回以内 (塗布は1回以内、散布は3回以内)
ぶどう	クビアカスガバ	40g/樹	幼果期まで但し、収穫30日前まで			3回以内 (塗布は1回以内)

*収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数を示します。

本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。本印刷物は2021年12月22日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

ABW1W01a



三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社
 東京都中央区日本橋1-19-1日本橋ダイヤビルディング
 ホームページ <https://www.mc-croplifesolutions.com>

■適用害虫及び使用方法(野菜)

(2021年12月22日付拡大登録内容を含む)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
とうもろこし(子実)	ムギクビアブラムシ、カメムシ類	2000	100~300ℓ/10a	前日	3回以内	散布	3回以内	
未成熟とうもろこし	アブラムシ類、カメムシ類			7日	2回以内			2回以内
ばれいしよ	ワタアブラムシ			3日	1回			
かんしよ	アブラムシ類、コナジラミ類	2000~3000		前日	2回以内	散布		
トマト	カメムシ類							
ミニトマト	コナジラミ類	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当たり0.5ℓ**	鉢上時又は定植時	1回	灌注		
ブロッコリー	アブラムシ類、コナガ	2000~3000		前日	3日	散布		
	アブラムシ類							
ピーマン	コナジラミ類	2000~3000		前日	3日	散布		
なす	アブラムシ類							
	アザミウマ類、カメムシ類							
とうがらし類	コナジラミ類	2000~3000	100~300ℓ/10a	前日	2回以内	散布	下表参照***	
	アブラムシ類	3000						
	アザミウマ類、ナスミバエ	2000						
とうがらし(葉)	コナジラミ類	2000~3000		14日	2回以内	散布	下表参照***	
	アブラムシ類	3000						
	アザミウマ類	2000						
かぼちゃ	アブラムシ類	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当たり0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注		
	アブラムシ類、コナジラミ類	2000		前日	3日	散布		
ズッキーニ	アブラムシ類							
きゅうり	コナジラミ類、アブラムシ類	2000~3000	100~300ℓ/10a	前日	2回以内	散布	下表参照***	
	アザミウマ類、ウリハムシ	2000						
	カメムシ類	2000						
きゅうり(葉)	コナジラミ類、アブラムシ類	3000		3日	2回以内	散布	下表参照***	
きゅうり(花)	アブラムシ類	3000						
すいか	アブラムシ類	2000~3000						
まくわうり	アブラムシ類	3000		7日	2回以内	散布	下表参照***	
メロン	コナジラミ類	2000~3000						
	アザミウマ類	2000						
うり類(漬物用)	アブラムシ類	2000		前日	2回以内	散布	下表参照***	
	アブラムシ類	2000~3000						
	アブラムシ類	3000						
にがうり	コナジラミ類	2000		14日	2回以内	散布	下表参照***	
セルリー	アブラムシ類	2000						
	アブラムシ類	2000						
キャベツ	アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ	50~100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当たり0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注	下表参照***	
	アブラムシ類	2000~3000		3日	2回以内	散布	下表参照***	
はくさい	キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	2000						
	アブラムシ類	2000~3000						
だいこん	キスジノミハムシ	1000	100~300ℓ/10a	7日	2回以内	散布	下表参照***	
	ダイコンハムシ	2000						
	アブラムシ類	2000~3000						
クレソン	アブラムシ類	3000		3日	3回以内	2回以内	3回以内	
レタス	アブラムシ類	2000~3000						
非結球レタス	アブラムシ類	2000~3000						
ねぎ	アザミウマ類	2000	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当たり0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注	下表参照***	
	アザミウマ類	1000						
	アザミウマ類	400						
	ハモグリバエ類	400		生育期但し、14日	1回	株元灌注	下表参照***	
	トビロヒョウタンゾウムシ	400						
	クロバネキノコバエ類	1000						

*収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数を示します。 **セル成型育苗トレイ、ペーパーポットは30×60cm使用土壌1.5~4.0ℓ(トマト、ミニトマト、ブロッコリー、かぼちゃ、レタス、非結球レタス、ねぎ)、約3ℓ(キャベツ)
※適用場所:水田 ※※適用場所:ガラス等の施設
***ジノテフランを含む農薬の総使用回数

きゅうり	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	トマト	5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	レタス	4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
とうがらし類	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	ブロッコリー	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	かぶ、非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイ、畑わさびを除く)、ほうれんそう	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
すいか	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	はくさい	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	だいこん	5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
にがうり	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	キャベツ	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	チンゲンサイ	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
とうがらし(葉)	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	ねぎ	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	しゅんぎく	3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内)
かぼちゃ	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	わけぎ	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	オクラ、さやえんどう、実えんどう、さやいんげん、しょうが	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)
ズッキーニ	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	にら	3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	ふき	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)
なす	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)			せり※	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)
ピーマン	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)			せり(水耕栽培)※※	3回以内
メロン	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)				