

総合殺菌剤

低コスト農業の強い味方。



ももの
せん孔細菌病に
適用拡大!

多くの作物の病害に
優れた防除効果



MIC
ペンコゼブ[®]
水和剤



MIC マンゼブ[®]

水和剤

殺菌剤分類 M3

一般名：マンゼブ (mancozeb: ISO名)
有効成分：マンゼブ・・・80.0%
人畜毒性：普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

1 多くの作物の 広範囲の病害に

病原菌の孢子発芽や菌糸生育を強く阻害することにより、広範囲の病害に優れた防除効果が期待できます。

2 予防効果に優れ、 安定した効果

付着性、耐雨性に優れ、散布された有効成分が植物の表面を長く保護するので、安定した予防効果が期待できます。

3 適用作物への 薬害も少ない

適用作物への影響は少なく、薬害の心配はほとんどありません。

適用作物・病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量(L)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
みかん	黒点病	400~800	200~700	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内
	小黒点病	600~800					
	そうか病	400					
	チャノキイロアザミウマ、そばかす病、褐色腐敗病	400~600					
	ミカンサビダニ	1,000					
炭疽病	600						
かんきつ (みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ、炭疽病、褐色腐敗病、そばかす病、汚果果症	600					
	黒点病、小黒点病	600~800		収穫90日前まで	2回以内		
	ミカンサビダニ	1,000					
かき	炭疽病、落葉病	400~800		収穫45日前まで			
	うどんこ病	400	収穫30日前まで	5回以内			
なし	黒星病、赤星病	400~600					
	黒斑病、輪紋病	600					
りんご	黒星病、赤星病、黒点病、斑点落葉病、褐斑病、炭疽病、すす点病、すす斑病	500~600	500	3回以内	3回以内		
	輪紋病	500					
もも	黒星病、果実赤点病、せん孔細菌病	600	600	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	
おうとう	灰星病	600					
ぶどう	黒とう病、べと病、晩腐病、褐斑病、さび病	1,000	600	収穫45日前まで	2回以内	2回以内	
オリーブ	炭疽病	600					
びわ	たてぼや病	600					
マンゴー	炭疽病	800					
すいか	炭疽病、つる枯病	400~600	400~600	収穫7日前まで	7回以内	7回以内	
	褐色腐敗病	600		5回以内			
メロン	つる枯病、べと病	400~600	400~600	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
きゅうり	炭疽病、褐斑病、黒星病	600					
キャベツ	べと病	600~800	100~300	収穫30日前まで	1回	1回	
はくさい	べと病、黒斑病、白斑病	400~600					
ねぎ	べと病、黒斑病、さび病	600	600	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
たまねぎ	べと病、黒斑病、灰色かび病	600					
ばれいしょ	夏疫病	400~600	400~600	収穫3日前まで	5回以内	5回以内	
	疫病	400~600					
さといも	疫病	100	100~300	収穫7日前まで	10回以内	10回以内 (無人航空機散布は3回以内)	
		500					
てんさい	褐斑病	400~600	100~300	収穫21日前まで	5回以内	5回以内	
		125					
だいず	べと病、紫斑病	400	100~300	収穫45日前まで	3回以内	3回以内	
にんにく	葉枯病	400~600	100~300	収穫7日前まで	5回以内	5回以内	
さんしょう(果実)	さび病	400~600	200~700	最終収穫後から落葉期まで	3回以内	3回以内	
		600					
いちご	炭疽病	600	100~300	仮植栽培期但し収穫76日前まで	6回以内	6回以内	
アスパラガス (露地栽培)	褐斑病	600					
	斑点病、茎枯病	500	100~300	収穫終了後但し、秋期まで	2回以内	2回以内	
かぼちゃ	べと病、疫病	600					
やまのいも	炭疽病、葉渋病	400~600	400~600	収穫21日前まで	4回以内	4回以内	
トマト	疫病、葉かび病	800					
樹木類	炭疽病、斑点症(シュドサーコスボラ菌)	600	200~700	発病初期	4回以内	4回以内	
	枝枯細菌病			新梢伸長期~発病初期			

〈使用上の注意事項: 抜粋〉各作物に関する注意事項はラベルをご確認ください。

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- ボルドー液との7日以内の近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 極端な高温多湿条件下では、軟弱幼苗に薬害の出るおそれがあるので注意してください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。

- かぶれやすい人は作業に従事しないようにし、施用した作物との接触はさけてください。
- 夏期高温時の使用はさけてください。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

*本製品は農業用殺菌剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

*本印刷物は2023年9月現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例にあてはまるものではありません。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

取り扱い

PZW1W01G



三井化学クロップ&ライフ
ソリューション株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <https://www.mc-croplifesolutions.com>