

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数
おうとう	灰星病 幼果菌核病 炭疽病 褐色せん孔病	1500 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病	1500～ 3000 倍					
	黒斑病	1500 倍					
	褐色斑点病	1500～ 2000 倍					
ぶどう	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 晩腐病 黒とう病 さび病	1500 倍		収穫 7 日 前まで			
小粒核果類	灰星病 環紋葉枯病 すす斑病(うめ) すす点病(すもも)	1500～ 2000 倍		収穫前日 まで			
もも	黒星病 果実赤点病						
	うどんこ病						
ネクタリン	黒星病 灰星病						
りんご	黒点病 斑点落葉病 褐斑病 灰色かび病	1500～ 3000 倍					
	黒星病 赤星病 モニア病 すす点病 すす斑病 うどんこ病						
かんきつ	黒点病 灰色かび病 そうか病	1500～ 2000 倍					
かき	うどんこ病 灰色かび病 落葉病 炭疽病 すす点病						
	いちじく		さび病 灰色かび病				