

2023年2月14日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数																																										
キャベツ	べと病 株腐病 菌核病	1000倍	100~300 L /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内	3回以内 (は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内)																																										
		16倍	1.6 L /10a			無人航空機による散布			はくさい	黒斑病 白斑病 白さび病 べと病 菌核病	1000倍	100~300 L /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内 (は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病	収穫3日前まで	5回以内	すいか	うどんこ病 つる枯病 炭疽病 菌核病	1000倍	100~300 L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	14回以内 (土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)	きゅうり	べと病 うどんこ病 灰色かび病 褐斑病 炭疽病 黒星病	4回以内	にがうり	うどんこ病	16倍	1.6 L /10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	3回以内	かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病 べと病 白斑病	トマト	疫病 うどんこ病 灰色かび病 葉かび病 すすかび病	1000倍	100~300 L /10a	収穫前日まで	2回以内
はくさい	黒斑病 白斑病 白さび病 べと病 菌核病	1000倍	100~300 L /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内 (は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)																																										
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病			収穫3日前まで				5回以内																																										
すいか	うどんこ病 つる枯病 炭疽病 菌核病	1000倍	100~300 L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	14回以内 (土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)																																										
きゅうり	べと病 うどんこ病 灰色かび病 褐斑病 炭疽病 黒星病								4回以内																																									
にがうり	うどんこ病	16倍	1.6 L /10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	3回以内																																										
かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病 べと病 白斑病																																																	
トマト	疫病 うどんこ病 灰色かび病 葉かび病 すすかび病	1000倍	100~300 L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内	6回以内 (土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)																																										
ミニトマト	斑点病							2回以内																																										

2023年2月14日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
なす	うどんこ病 灰色かび病 すすかび病 菌核病 黒枯病 褐色斑点病 褐色円星病	1000倍	100~300 L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
ピーマン	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 黒枯病 斑点病							3回以内
たまねぎ	べと病 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	16倍	1.6 L /10a	収穫7日前まで	4回以内	無人航空機による散布	4回以内	6回以内
にんにく	さび病	1000倍	100~300 L /10a		3回以内		散布	
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病			収穫前日まで	4回以内	4回以内		4回以内
ねぎ	べと病 さび病 白絹病 葉枯病 黒斑病 小菌核腐敗病	16倍	1.6 L /10a	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	4回以内 (株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	4回以内 (土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
レタス	べと病 菌核病 すす枯病 灰色かび病	1000倍	100~300 L /10a		3回以内		散布	3回以内
リーフレタス				収穫21日前まで	2回以内	2回以内		
ブロッコリー	菌核病 べと病 黒すす病	16倍	1.6 L /10a	出蕾前 但し、 収穫21日前まで	2回以内	無人航空機による散布	3回以内 (土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	
きく	白さび病	1000倍	100~300 L /10a	発病前~ 発病初期	3回以内		散布	6回以内