

2023年12月20日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シアントリプロール を含む農薬の 総使用回数	
未成熟とう もろこし	アブラムシ類	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
	アブラムシ カメムシ アブラムシ類	40倍	2～ 3.2L/10a			無人航空機による散布		
		2000～ 4000倍	100～ 300L/10a			散布		
えだまめ	ハスモンヨトウ マメシクイ アブラムシ類	2000～ 4000倍		0.8～ 2.4L/10a		収穫7日 前まで	無人航空機による散布	4回以内 (は種前の処理は 1回以内、は種後の 処理は3回以内)
		32倍						
だいず	ハスモンヨトウ マメシクイ アブラムシ類	2000～ 4000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで		3回以内	散布	3回以内
		4000倍						
さやいん げん	ハスモンヨトウ	4000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで			無人航空機による散布	
	ハモグリバエ類	2000倍						
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカシロシタハ アブラムシ アブラムシ ヨシカメコ ヒカカメコ	4000倍	1～2L /10a	収穫7日 前まで	散布			
		40倍						
ばれい しょ	ハスモンヨトウ	4000倍	100～ 300L/10a	収穫7日 前まで	無人航空機による散布			
	アブラムシ類	40倍	2～3.2L /10a		散布			
		2000倍	100～ 300L/10a		無人航空機による散布			
やまのいも	カゲイモコガ ハスモンヨトウ アブラムシ類	4000倍		1～3L /10a	散布			
		40倍	無人航空機による散布					

2023年12月20日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シアンリブロール を含む農薬の 総使用回数
だいこん	アブラムシ類 ハモグリバエ類 キスジノミハムシ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (は種時までの処理 は 1 回以内、は種後 の処理は 3 回以内)
	ヨトウムシ	4000 倍					
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハチ類 ダイコンハムシ	2000～ 4000 倍	1～2L /10a			無人航 空機に よる 散布	
	アブラムシ類 ハモグリバエ類 キスジノミハムシ ヨトウムシ	20 倍					
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウリバ類 シロイチモンズヨトウ	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a			散布	4 回以内 (定植時までの処理 は 1 回以内、定植 後の散布は 3 回以内)
	アブラムシ類 キスジノミハムシ	2000 倍					
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウリバ類 オオタバコガ シロイチモンズヨトウ	2000～ 4000 倍	1～2L /10a			無人航 空機に よる 散布	4 回以内 (定植時までの処理 は 1 回以内、定植 後の処理は 3 回以内)
	アザミウマ類 アブラムシ類	20 倍					
	アブラムシ類	2000 倍					
ブロッコリー	アオムシ ハスモンヨトウ コナガ シロイチモンズヨトウ	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a	散布	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内)		
	アザミウマ類 アブラムシ類	20 倍	1～2L /10a				
	アブラムシ類	2000 倍					
レタス 非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウリバ類 シロイチモンズヨトウ	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a	散布	3 回以内		
	ハモグリバエ類 アブラムシ類	2000 倍					

2023 年 12 月 20 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	シイモシヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネギコガ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (定植時までの処理 は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内(但し、 株元灌注は 1 回以内))	
		20 倍	1～2L /10a			無人 航空 機に よる 散布		
たまねぎ	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ シイモシヨトウ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日 前まで		散布	3 回以内	
		20 倍	1～2L /10a			無人 航空 機に よる 散布		
	アザミウマ類	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a			散布		
にんにく	アザシカ類 ネギコガ アブラムシ類	2000 倍	1～2L /10a	収穫7日前 まで		無人 航空 機に よる 散布		
		20 倍						
アスパラガス	ハスモンヨトウ	4000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで		3 回以内		散布
にんじん	アザシカ類	2000 倍						
	アブラムシ類	4000 倍						
トマト ミニトマト	ヨウムシ ハスモンヨトウ キアゲハ	4000 倍						
	オオタバコガ	2000～ 4000 倍						
ピーマン	ハモグリバエ類 コナジラミ類 アブラムシ類 アザシカ類 トマトキバガ	2000 倍						
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000～ 4000 倍						
ししとう	オオタバコガ	2000～ 4000 倍						
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザシカ類	2000 倍						
	オオタバコガ	2000～ 4000 倍						

2023 年 12 月 20 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリメカイ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (定植時までの 処理及び定植 直後の株元灌注 は合計 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)
かぼちゃ	ハモグリバエ類	20 倍	1～2L/10a				
	ハスモンヨトウ			4000 倍			
オクラ	アブラムシ類	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫開始3 日前まで		散布	4 回以内 (灌注は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
いちご	ハスモンヨトウ	2000～ 4000 倍		収穫前日 まで			
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チバクロハネキノ バエ	2000 倍					
たばこ	ヨトウムシ タバコミハムシ	4000 倍	100～ 180L/10a	収穫 10 日 前まで	2 回以内	2 回以内	