

登録番号 第 24107 号

サンブラス®パック

- 特長：
- 1成分で2つの作用性（メラニン生合成阻害 MBI-P と病害抵抗性修道）を持つ有効成分トルプロカルブを配合し、いもち病菌を強力にブロックします。
 - 残効性に優れています。
 - 黒ボク土壌でも防除効果が安定しています。
 - 散布器具が要らない省力的な、投げ込み製剤です。
 - 農林水産省「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に掲載された農薬です。

有効成分	トルプロカルブ・・・20.0%	包装	(45g×10)×10
性状	褐色細粒 水溶性パック入り 1パック 45g	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用病害及び使用方法】

2023年2月22日付内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルプロカルブを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病	小包装 (パック) 10個 (450g)/10a	出穂5日前 まで、但し、 収穫30日前 まで	1回	水田に小包装(パック) のまま投げ入れる。	2回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での湛水散布、無人航空機 散布、投げ入れは合計1回以内)

使用上の注意事項

- (1) 小包装（パック）に使用しているフィルムは水溶性のため、濡れた手で作業したり、降雨等で破袋しないように注意すること。
- (2) 本剤の使用に当たっては、湛水深を3cm以上にし、水田に投げ入れた後は少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水及びかけ流しをしないこと。
- (3) 本剤は小包装（パック）のまま10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れること。
- (4) 藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり効果が劣る可能性があるため使用をさけること。
- (5) 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理すること。
- (6) 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。とくに本剤を初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- (1) 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用法ではその該当がない。ただし、濡れた手で触らないこと。
- (2) 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意すること。
 - 1) 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
 - 2) 皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨-----

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨-----

通常的使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。水溶性フィルムは吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管すること。また、強く加圧されると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにすること。