

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	プロフレアSC を含む 農薬の総 使用回数				
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ	2000～ 4000倍	100～ 300L /10a	収穫 前日 まで	3回 以内	散布	3回以内				
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ シロイチモジヨトウ										
だいこん	コナガ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ カブラハバチ類 アオムシ ダイコンハムシ										
かぶ	コナガ キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ アオムシ ハスモンヨトウ ダイコンハムシ										
はなやさい類	アオムシ オオタバコガ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ										
非結球あぶらな科 葉菜類	コナガ アオムシ キスジノミハムシ										
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ										
ねぎ	ネギコガ シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ										
えだまめ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ マメシンクイガ ツメクサガ ウコンノメイガ							16～ 32倍	0.8～ 1.6L/ 10a	発生 初期	無人 航空 機に よる 散布
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ ヒルガオハモグリガ エビガラスズメ							2000～ 4000倍	100～ 300L /10a		
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ										