

想像を超える

# プロフレア® SC BROFREYA

適用害虫  
追加

2023年8月

プロフレア、テネベナルは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標  
INSECTICIDE for Lepidoptera and Leaf Beetles

殺虫剤

チョウ目・ハムシ専門剤



チョウ目被害



ハムシ被害

殺虫剤

チョウ目・  
ハムシ専門剤プロフレア<sup>®</sup>SC農林水産省登録 第24422号  
有効成分：プロフラニリド 5.0%

殺虫剤分類 30

## 想像を超える! 6つの特長

## 1 新規の作用性

プロフラニリドの作用性は、IRACにより、世界で初めてグループ30に分類されました。

## 2 チョウ目・ハムシ専門剤

チョウ目とキスジノミハムシが同時防除できるので、特にあぶらな科野菜に最適です。

## 3 速攻的に効く

数時間で作用を発現し、速やかな殺虫効果を示します。

## 4 3週間の残効性

薬剤は葉面上で3週間程度の効果を示します。

## 5 雨にも強い

突然の雨があっても、効果の持続性に変わりありません。

## 6 抵抗性害虫にも有効

既存剤に抵抗性を獲得したコナガやシロイチモジヨトウにも効果を示します。

## 適用害虫と使用方法

2023年8月現在

| 作物名             | 適用害虫名   | 希釈倍数       | 使用液量          | 使用時期   | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロフラニリドを含む農薬の総使用回数 |            |               |      |            |
|-----------------|---|------------|---------------|--------|---------|------|--------------------|------------|---------------|------|------------|
| キャベツ            | ・コナガ・アオムシ・ハスモンヨトウ<br>・ヨトウムシ・オオタバコガ<br>・ウワバ類・ハイマダラノメイガ<br>・シロイチモジヨトウ                         | 2000～4000倍 | 100～300L /10a | 収穫前日まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内               |            |               |      |            |
| はくさい            | ・コナガ・アオムシ・ハスモンヨトウ<br>・ヨトウムシ・オオタバコガ<br>・ハイマダラノメイガ<br>・カブラハバチ類・キスジノミハムシ<br>・ダイコンハムシ・シロイチモジヨトウ |            |               |        |         |      |                    |            |               |      |            |
| だいこん            | ・コナガ・ヨトウムシ<br>・ハイマダラノメイガ<br>・キスジノミハムシ・カブラハバチ類<br>・アオムシ・ダイコンハムシ                              |            |               |        |         |      |                    |            |               |      |            |
| かぶ              | ・コナガ・キスジノミハムシ<br>・ハイマダラノメイガ・アオムシ<br>・ハスモンヨトウ・ダイコンハムシ  |            |               |        |         |      |                    |            |               |      |            |
| はなやさい類          | ・アオムシ・オオタバコガ・コナガ<br>・ハスモンヨトウ・ヨトウムシ<br>・ウワバ類・ハイマダラノメイガ<br>・シロイチモジヨトウ                         |            |               |        |         |      |                    |            |               |      |            |
| 非結球あぶらな科<br>葉菜類 | ・コナガ・アオムシ<br>・キスジノミハムシ  |            |               |        |         |      |                    |            |               |      |            |
| レタス<br>非結球レタス   | ・ハスモンヨトウ・ヨトウムシ<br>・オオタバコガ・ウワバ類<br>・シロイチモジヨトウ  |            |               |        |         |      |                    |            |               |      |            |
| ねぎ              | ・ネギコガ・シロイチモジヨトウ<br>・ネギハモグリバエ  |            |               |        |         |      |                    |            |               |      |            |
| えだまめ            | ・ハスモンヨトウ・オオタバコガ<br>・ダイズサヤタマバエ<br>・フタスジヒメハムシ・マメシンクイガ<br>・ツメクサガ・ウコンノメイガ                       |            |               |        |         |      |                    | 16～32倍     | 0.8～1.6L /10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 |
| かんしょ            | ・ハスモンヨトウ・ナカジロシタバ<br>・ヨツモンカメノコハムシ<br>・ヒルガオハモグリガ・エビガラスズメ                                      |            |               |        |         |      |                    | 2000～4000倍 | 100～300L /10a |      |            |
| きく              | ・ハスモンヨトウ・オオタバコガ   | 散布         |               |        |         |      |                    |            |               |      |            |

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○本剤は小児の手の届く所に置かないでください。  
○ラベルの記載以外には使用しないでください。○空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

\*本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には、使用しないでください。  
\*本印刷物は2023年8月現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

取扱い

三井化学クロップ&ライフ  
ソリューション株式会社東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング  
ホームページ <https://www.mc-croplifesolutions.com>

BFA1001E