

C s . オリゼリディアEV箱粒剤 (第 24485 号)

2024 年 2 月 14 日現在

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	フルリシを含む農薬の総使用回数	プロバザールを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
湛水直播水稲	いもち病 紋枯病 イネヌズゾウムシ	1kg/10a	は種時	1 回	は種同時 施薬機を 用いて土 中施用す る。	3 回以内 (は種時ま での処理は 1 回 以内、本田で は 2 回以内)	2 回以内 (は種時ま での処理は 1 回以内)	1 回
稲	いもち病 紋枯病 イネトロイムシ イネヌズゾウムシ ウカ類		移植時		側条施用	3 回以内 (直播では 種時又は移植 時までの処理 は 1 回以内、 本田では 2 回 以内)		
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 イネトロイムシ イネヌズゾウムシ ウカ類 ツマグロヨコバイ	育苗箱 (30×60×3cm、使 用土壌約 5L) 1 箱 当り 50g	移植 7 日前～ 移植当日		育苗箱の 上から均 一に散布 する。	3 回以内 (移植時ま での処理は 1 回 以内、本田で は 2 回以内)	2 回以内 (移植時ま での処理は 1 回以内)	
	ニカメイチュウ フタホヒコヤガ 付コ類	高密度には種する 場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、使 用土壌約 5L) 1 箱 当り 50～100g)	移植 3 日前～ 移植当日					