

サンバード粒剤 (第14205号)

2011年4月6日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピラゾレートを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ヒルムシロ	移植直後～ ルビエ1葉期、 ただし、移植 後30日まで	壤土～ 埴土	3～4 kg/10a	2回 以内	湛水 散布	北海道	2回以内
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ ヘラオモダカ (東北、北陸) オモダカ (東北、関東・ 東山・東海)		砂壤土 ～ 埴土				全域 (北海道を 除く)の普 通期及び早 期栽培地帯	
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	は種時	砂壤土 ～ 埴土	3 kg/10a	1回	は種 同時 散布 機で 施用	全域	2回以内
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ			1.5 kg/10a (少量 散布)			全域 (北海道を 除く)	
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	は種直後～ ルビエ1葉期、 ただし、収穫 90日前まで		3 kg/10a	2回 以内	湛水 散布 又は 無人 ヘリ コプ ター によ る散 布	全域	
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ	は種直後～ ルビエ1葉期、 ただし、収穫 90日前まで					1.5 kg/10a (少量 散布)	