

トレボンMC (第 19355 号)

2014 年 12 月 17 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数		
稲	—	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	1000～ 2000 倍	60～ 150L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内		
		カメムシ類 イネドロオイムシ	2000 倍							
		イナゴ類 コブノメイガ	1000 倍							
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	600 倍	25L/10a						
ばれいしょ		アブラムシ類	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内		3 回以内		
だいず えだまめ		カメムシ類 ハスモンヨトウ マメシクイガ			収穫 14 日 前まで				2 回以内	
きゅうり		アブラムシ類 ウリノメイガ			収穫 前日まで				3 回以内	
なす		アブラムシ類			収穫 3 日 前まで					
キャベツ		ハイマダラノメイガ アオムシ ヨトウムシ								収穫 7 日 前まで
はくさい		アブラムシ類 ヨトウムシ								収穫 21 日 前まで
だいこん		ヨトウムシ								収穫 14 日 前まで
てんさい		ヨトウムシ			収穫 14 日 前まで					
つつじ類	ツツジグンバイ	2000～ 4000 倍	100～ 700L/10a	—	6 回以内	6 回以内				
樹木類 (つつじ類、 いぬまき を除く)	ケムシ類									
いぬまき	ケブカトラカミキリ									
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ス スキ、セイタカ アワダチソウ 等の多年 生雑草が 優占して いる休耕 田	カメムシ類	2000 倍	60～ 150L/10a	—	3 回以内	3 回以内			