

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬の総使用回数					
かぼちゃ	ワタアブラムシ	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内					
いちご	イチゴメセンチュウ イチゴセンチュウ			100~300 L/10a	育苗期 定植後 生育初期		4回以内	散布	4回以内			
	イチゴメセンチュウ コガネムシ類幼虫	1~2L/m ² 2~3L/m ²	移植活着後 (育苗期)		4回以内	灌注				4回以内		
ピーマン (露地栽培)	タバコガ ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫開始14 日前まで	3回以内	散布	3回以内					
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 タマナギンウワバ			1000~2000倍				100~300 L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	はくさい								アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			
こまつな	アブラムシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内					
かぶ	アオムシ アブラムシ類			1000~2000倍				100~300 L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	2回以内 (植付時の 土壌混和は 1回以内)	
レタス	ヨトウムシ アブラムシ類	1000~2000倍	100~300 L/10a		収穫21日前 まで	2回以内	散布		2回以内 (植付時の 土壌混和は 1回以内)			
	オオタバコガ ナメクシ類	1000倍										
サラダ菜	ヨトウムシ アブラムシ類	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内					
	オオタバコガ	1000倍										
カリフラワー	ヨトウムシ アブラムシ類	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内					
ブロッコリー	ヨトウムシ アブラムシ類			1000~2000倍				収穫7日前 まで				
ほうれんそう	ヨトウムシ シジメアザミ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫14日前 まで	4回以内	散布	4回以内					
	アブラムシ類	1000倍										
ねぎ	シロイチモジヨトウ クロバネキノコバエ類	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内					
	ネギアザミウマ	1000~2000倍										
たまねぎ	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内					
しょうが	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メソミル を含む 農薬の総 使用回数	
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内 (は種時の 土壌混和は 1 回以内)	
ばれいしょ	ジャガイモガ ナストビハムシ ジョウネンシ アブラムシ類	1000 倍		収穫 7 日前 まで	5 回以内		5 回以内	
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	1000~2000倍		収穫 14 日 前まで	4 回以内		4 回以内	
だいず	ハスモンヨトウ シイロミダラメ マメシクイガ カメムシ類 ツメクサガ			収穫 7 日前 まで	3 回以内		3 回以内	
えだまめ	ヨトウムシ トビハムシ			5 回以内	5 回以内		5 回以内	
てんさい	ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 カバネコバエ類			1000 倍	収穫前日 まで		2 回以内	2 回以内 (は種前の 土壌混和は 1 回以内)
パセリ	アブラムシ類	2000 倍		収穫 30 日前 まで	1 回		1 回	
茶	ハスモンヨトウ チャトゲコナジラミ	1000 倍		200~400 L/10a	摘採 21 日前 まで		2 回以内	2 回以内
	コカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ ミドリヒメヨコバエ	1000~1500倍						
	チャノイロアザミ ツマグロアカスミカメ	1000~2000倍						
食用ゆり	カバネコバエ類	500 倍	—	植付前	1 回	30 分間 種球浸漬	1 回	
セルリー	ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 30 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内	
アスパラガス	ネギアザミウマ			収穫前日 まで	1 回		1 回	2 回以内 (散布は 1 回以内、 灌注は 1 回 以内)
	ナメクジ類		1~3L/m ²	収穫 3 日前 まで				
にら	ネギアザミウマ カバネコバエ類		1L/m ²	収穫 21 日前 まで	2 回以内	灌注	2 回以内	
らっきょう	ネダニ類							
ごぼう	アブラムシ類	100~300 L/10a	100~300 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬の総使用回数
チンゲンサイ	アブラムシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内
たばこ	タバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000~2000倍	25~180 L/10a	収穫10日前 まで			