

| 作物名          | 適用病害虫名   | 使用量     | 使用時期                 | 本剤の使用回数    | 使用方法                            | ジノテフランを含む農薬の総使用回数   |                                 |   |
|--------------|--|---------|----------------------|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 稲            | ウンカ類<br>ツマグロヨコバイ<br>ニカメイチュウ<br>イネドロオイムシ<br>カメムシ類<br>イネミズゾウムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで              | 3回以内       | 散布                              | 4回以内<br>(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |                                 |   |
| きゅうり         | ハモグリバエ類  | 2g/株    | 育苗期                  | 1回         | 株元散布                            | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |                                 |   |
|              | ハモグリバエ類<br>アザミウマ類  |         | 定植時                  |            | 植穴<br>土壌混和                      |   |                                 |   |
|              | コナジラミ類   | 1~2g/株  | 育苗期                  |            | 株元散布                            |   |                                 |   |
|              | アブラムシ類   | 1g/株    | 生育期<br>但し、収穫開始14日前まで |            |                                 |   |                                 |   |
|              | コナジラミ類<br>アブラムシ類   |         | 1~2g/株               |            | 定植時                             |   | 植穴<br>土壌混和                      |   |
| うり類<br>(漬物用) | アザミウマ類   | 2g/株    | 定植時                  |            | 植穴<br>土壌混和                      |   | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |   |
|              | アブラムシ類<br>コナジラミ類   | 1~2g/株  |                      |            |                                 |   |                                 |   |
| メロン          | アブラムシ類   | 1g/株    | 育苗期                  |            | 1回                              |   | 株元散布                            | 3回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
|              |  |         | 定植時                  |            |                                 |   | 植穴<br>土壌混和                      |   |
|              | コナジラミ類   | 1~2g/株  | 育苗期                  |            |                                 |   | 株元散布                            |   |
|              |  |         | 定植時                  | 植穴<br>土壌混和 |                                 |   |                                 |   |
| ハモグリバエ類      |  | 育苗期     | 植穴<br>土壌混和           |            |                                 |   |                                 |   |
|              |  | 定植時     |                      |            |                                 |   |                                 |   |
| すいか          | ワタアブラムシ  | 2g/株    | 定植時                  | 植穴<br>土壌混和 |                                 | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |                                 |   |
|              |  |         | 生育期<br>但し、収穫21日前まで   |            |                                 |   |                                 |   |
|              |  |         | 育苗期                  |            |                                 |   | 株元散布                            |   |
| かぼちゃ         | アブラムシ類<br>コナジラミ類   |         | 定植時                  | 植穴<br>土壌混和 |                                 | 3回以内<br>(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)              |                                 |   |
| にがうり         | コナジラミ類   |         |                      |            | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |   |                                 |   |

| 作物名          | 適用病害虫名            | 使用量            | 使用時期                         | 本剤の使用回数    | 使用方法       | ジメテランを含む農薬の総使用回数  |                              |
|--------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| ズッキーニ        | コナジラミ類            | 2g/株           | 定植時                          | 1回         | 植穴<br>土壌混和 | 4回以内<br>(定植時の土<br>壌混和は1回<br>以内、定植後<br>の株元散布は<br>1回以内、<br>散布は<br>2回以内)   |                              |
|              | アブラムシ類            |                |                              |            | 1g/株       |   | 生育期<br>但し、<br>収穫開始14<br>日前まで |
| なす           | ハモグリバエ類           | 2g/株           | 育苗期                          |            | 株元散布       | 3回以内<br>(育苗期の株<br>元散布及び<br>定植時の土<br>壌混和は合<br>計1回以<br>内、散布及<br>び定植後の<br>株元散布は<br>合計2回<br>以内)                                   |                              |
|              | ハモグリバエ類<br>アザミウマ類 | 1~2g/株         | 定植時                          |            | 植穴<br>土壌混和 |   |                              |
|              | コナジラミ類            |                | 育苗期                          |            | 株元散布       |   |                              |
|              | アブラムシ類            | 1g/株           | 定植時                          | 植穴<br>土壌混和 |            |   |                              |
|              | コナジラミ類<br>アブラムシ類  |                | 生育期<br>但し、<br>収穫前日まで         | 2回以内       | 株元散布       |   |                              |
| ピーマン         | アザミウマ類            | 1~2g/株         | 定植時                          | 1回         | 植穴<br>土壌混和 | 3回以内<br>(育苗期の株<br>元散布及び<br>定植時の土<br>壌混和は合<br>計1回以<br>内、散布及<br>び定植後の<br>株元散布は<br>合計2回以<br>内)                                   |                              |
|              | アブラムシ類            | 1g/株           |                              |            |            |   | 生育期<br>但し、<br>収穫前日まで         |
|              |                   |                | 育苗期                          |            |            |   |                              |
| トマト<br>ミニトマト | コナジラミ類            | 培土1L 当り<br>10g | は種前                          | 1回         | 培土混和       | 5回以内<br>(培土混和及<br>び灌漑は合<br>計1回以<br>内、育苗期<br>の株元散<br>布は1回以<br>内、定植時<br>の土壌混和<br>は1回以<br>内、散布<br>及び定植後<br>の株元散布<br>は合計2回<br>以内) |                              |
|              | ハモグリバエ類<br>コナジラミ類 | 1~2g/株         | 定植時                          |            | 植穴<br>土壌混和 |   |                              |
|              |                   |                | 育苗期                          | 株元散布       |            |   |                              |
|              | コナジラミ類            | 1g/株           | 生育期<br>但し、<br>収穫前日まで         |            | 2回以内       |   |                              |
| アブラムシ類       | 定植時               |                | 植穴<br>土壌混和                   |            |            |   |                              |
| とうがらし類       | アザミウマ類            | 1~2g/株         | 定植時                          | 1回         | 植穴<br>土壌混和 | 4回以内<br>(育苗期の株<br>元散布及び<br>定植時の土<br>壌混和は合<br>計1回以<br>内、定植後<br>の株元散布<br>は1回以<br>内、散布は<br>2回以内)                                 |                              |
|              | アブラムシ類            | 1g/株           | 生育期<br>但し、<br>収穫開始14<br>日前まで |            |            |   | 株元散布                         |
|              |                   |                | 育苗期                          |            |            |   |                              |
| コナジラミ類       |                   |                |                              |            |            |   |                              |

| 作物名      | 適用病害虫名               | 使用量           | 使用時期                    | 本剤の使用回数 | 使用方法       | シノテフランを含む農薬の総使用回数  |   |
|----------|----------------------|---------------|-------------------------|---------|------------|--|---|
| とうがらし(葉) | アザミウマ類<br>アブラムシ類     | 1g/株          | 定植時<br>但し、収穫<br>30 日前まで | 1 回     | 植穴<br>土壌混和 | 3 回以内<br>(定植時の土壌<br>混和は 1 回以<br>内、散布は 2<br>回以内)  |   |
| キャベツ     | アブラムシ類               | 2g/株          | 育苗期                     |         | 株元散布       | 3 回以内<br>(育苗期の株<br>元散布、定植<br>時の土壌混和<br>及び灌水は合<br>計 1 回以内、<br>散布及び無人<br>航空機散布は<br>合計 2 回以<br>内) |   |
|          | アオムシ<br>コナガ          | 2~3g/株        | 定植時                     |         | 植穴<br>土壌混和 |  |   |
|          | ハイマダラノメイガ            | 3g/株          |                         |         |            |  |   |
| はくさい     | アブラムシ類               | 2g/株          | 定植時                     |         | 植穴<br>土壌混和 | 3 回以内<br>(定植時の土<br>壌混和及び灌<br>注は合計 1 回<br>以内、散布は<br>2 回以内)                                      |   |
|          | アオムシ<br>コナガ          | 2~3g/株        |                         |         |            |  |   |
|          | ハイマダラノメイガ            | 3g/株          |                         |         |            |  |   |
| ブロッコリー   | アブラムシ類<br>コナガ        | 2g/株          |                         |         |            | 3 回以内<br>(定植時の土<br>壌混和及び灌<br>注は合計 1 回<br>以内、散布及<br>び無人航空機<br>散布は合計 2<br>回以内)                   |   |
| ねぎ       | アザミウマ類<br>ハモグリバエ類    | 6kg/10a       | は種時                     |         | 2 回以内      | 播溝<br>土壌混和   | 4 回以内<br>(は種時の土<br>壌混和、育苗<br>トレイへの灌<br>注及び定植時<br>の株元散布は<br>合計 1 回以<br>内、生育期の<br>株元灌水は 1<br>回以内、散<br>布、無人航空<br>機散布及び定<br>植後の株元散<br>布は合計 2 回<br>以内) |
|          |                      |               | 定植時                     |         |            | 株元散布   |   |
|          | アザミウマ類<br>クロバネキノコバエ類 |               | 生育期<br>但し、収穫 3<br>日前まで  |         |            |  |   |
|          | ハモグリバエ類              | 6~9kg<br>/10a |                         |         |            |  |   |
| わけぎ      | アザミウマ類<br>ハモグリバエ類    | 6kg/10a       | 生育期<br>但し、収穫 21<br>日前まで | 1 回     |            | 4 回以内<br>(定植後の株元<br>散布は 1 回以<br>内、生育期の<br>株元灌水は 1<br>回以内、散布<br>は 2 回以内)                        |   |
| らっきょう    | アザミウマ類               | 6kg/10a       | 生育期<br>但し、収穫前<br>日まで    | 3 回以内   | 散布         | 3 回以内  |   |
| にんじん     | ハモグリバエ類              | 9kg/10a       | は種時                     | 1 回     | 播溝<br>土壌混和 | 4 回以内<br>(は種時の土<br>壌混和は 1 回<br>以内、生育期の<br>株元灌水は 1<br>回以内、散布<br>は 2 回以内)                        |   |

| 作物名                                | 適用病害虫名             | 使用量                        | 使用時期  | 本剤の使用回数    | 使用方法  | ジノテフランを含む農薬の総使用回数   |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|------------|---|---|
| セルリー                               | アブラムシ類             | 2g/株                       | 定植時   | 1回         | 植穴<br>土壌混和  | 3回以内<br>(定植時の<br>土壌混和は<br>1回以内、<br>散布は2回<br>以内)   |
| だいこん                               | キスジノミハムシ           | 6kg/10a                    | は種時   |            | 播溝<br>土壌混和  | 5回以内<br>(は種時の播<br>溝土壌混和<br>は1回以内、<br>は種時の全<br>面土壌混和<br>は1回以<br>内、粒剤の<br>散布は1回<br>以内、水溶<br>剤の散布、<br>液剤の散布<br>及び無人航<br>空機散布は<br>合計2回以<br>内) |
|                                    |                    | 4~6kg/10a                  |       |            | 全面<br>土壌混和  |   |
|                                    |                    | 9~12kg/10a                 |       |            | 散布  |   |
|                                    | タネバエ               | 生育期<br>但し、<br>収穫30日前<br>まで |       |            |   |   |
| チンゲンサイ                             | キスジノミハムシ           | 6kg/10a                    | 定植時   |            | 土壌混和  | 3回以内<br>(は種時及び<br>定植時の土<br>壌混和は合<br>計1回以内、<br>散布は2回<br>以内)  |
|                                    | アブラムシ類<br>キスジノミハムシ |                            | は種時   |            | 播溝<br>土壌混和  |   |
| 非結球あぶら<br>な科葉菜類<br>(チンゲンサイ<br>を除く) | アブラムシ類<br>キスジノミハムシ | 6kg/10a                    | は種時   |            | 播溝<br>土壌混和  | 3回以内<br>(は種時の土<br>壌混和は<br>1回以内、<br>散布は2回<br>以内)   |
| かぶ                                 |                    |                            |       |            |   |   |
| ほうれんそう                             | アブラムシ類             | 6kg/10a                    | は種時   |            | 播溝<br>土壌混和  | 3回以内<br>(は種時の土<br>壌混和は<br>1回以内、<br>散布は2回<br>以内)   |
| レタス<br>非結球レタス                      | ナモグリハエ             | 培土1L 当り<br>15g             | は種前   | 培土混和       | 4回以内<br>(は種前の<br>培土混和は<br>1回以内、<br>育苗期の株<br>元散布、定<br>植時の土壌<br>混和及び育<br>苗トレイへの<br>灌注は合計<br>1回以内、<br>散布は2回<br>以内) |   |
|                                    | アブラムシ類<br>ナモグリハエ   | 1g/株                       | 育苗期後半 | 株元散布       |   |   |
| しゅんぎく                              | ハモグリバエ類            | 9kg/10a                    | は種時   | 播溝<br>土壌混和 | 3回以内<br>(は種時及び<br>定植時の土<br>壌混和は合<br>計1回以内、<br>散布は2回<br>以内)  |   |
|                                    |                    |                            | 定植時   | 植溝<br>土壌混和 |   |   |
| いちご                                | ワタアブラムシ            | 0.5~1g/株                   |       | 植穴<br>土壌混和 | 1回  |   |

2021 年 12 月 22 日現在

| 作物名             | 適用病虫害名        | 使用量                                 | 使用時期  | 本剤の使用回数                        | 使用方法                                       | ジノテフランを含む農薬の総使用回数   |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| かんきつ<br>(苗木)    | ミカンハモグリガ      | 20g/株                               | 育苗期   | 5 回以内                          | 株元散布                                       | 5 回以内   |
| なし(苗木)          | アブラムシ類        | 20g/株<br>(但し、10a<br>当り 110kg<br>まで) |   | 1 回                            |  | 1 回   |
| くわい             |               | 3kg/10a                             | 収穫 30 日前<br>まで                                    | 3 回以内                          | 散布   | 3 回以内   |
| ふき              |               | 20kg/10a                            | 定植後～<br>生育期<br>(草丈20cm頃<br>まで)<br>但し、収穫45日<br>前まで | 1 回                            | 土壤表面<br>散布                                 | 3回以内<br>(土壤表面<br>散布は1回<br>以内、散布は<br>2回以内)                                 |
| しょうが            | 9kg/10a       | 生育期<br>但し、<br>収穫 14 日前<br>まで        | 株元散布  |                                | 3 回以内<br>(株元散布は<br>1 回以内、<br>散布は<br>2 回以内) |   |
| オクラ<br>さやいんげん   |               | アブラムシ類                              |   |                                |  |   |
| さやえんどう<br>実えんどう |               | ハモグリバエ類                             |   | 生育期<br>但し、<br>収穫開始 14 日<br>前まで |  |   |
| だいず<br>えだまめ     | フタスジヒメハムシ     | 6kg/10a                             | は種時   | 2 回以内                          | 播溝<br>土壤混和                                 | 3 回以内<br>(は種時の<br>土壤混和は<br>1 回以内、散<br>布、空中散<br>布、無人航空<br>機散布は合計<br>2 回以内) |
| さとうきび           | カンシャコハネナガカメムシ | 6～9kg/10a                           | 生育期<br>但し、<br>収穫 45 日前<br>まで                      |                                | 散布   | 5 回以内<br>(粒剤は<br>2 回以内、<br>液剤、水溶<br>剤及び水和<br>剤は合計<br>3 回以内)               |
|                 | メイチュウ類        | 9 kg/10a                            | は種時   | 1 回                            | 全面土壤<br>混和                                 | 2 回以内<br>(は種時の全面<br>土壤混和は 1 回<br>以内、生育期の<br>株元散布は 1 回<br>以内)              |
| 葉ごぼう            | アブラムシ類        | 6 kg/10a                            |   |                                | 生育期<br>但し、<br>収穫 21 日前<br>まで               |   |
| しそ              | マデイロコナカイガラムシ  | 2g/株<br>(但し、10a 当り<br>25kg まで)      | 定植時   | 1 回                            | 植穴<br>土壤混和                                 | 3 回以内<br>(定植時の土<br>壤混和は 1 回<br>以内、散布は<br>2 回以内)                           |
| 食用ぎく            | アブラムシ類        | 1g/株<br>(但し、10a 当り<br>30kg まで)      |   |                                |  |   |
|                 | マメハモグリバエ      | 2g/株<br>(但し、10a 当り<br>30kg まで)      |   |                                |  |   |
| 茶               | クワシロカイガラムシ    | 12kg/10a                            | 摘採 7 日前<br>まで                                     | 2 回以内                          | 株元<br>土壤混和                                 | 2 回以内   |

2021 年 12 月 22 日現在

| 作物名                                  | 適用病虫害名           | 使用量                            | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法       | ジノテフランを含む農薬の総使用回数        |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|---------|------------|--------------------------|
| きく<br>ガーベラ                           | マメハモグリバエ         | 2g/株<br>(但し、10a 当り<br>30kg まで) | 定植時  | 1 回     | 植穴<br>土壌混和 | 5 回以内<br>(土壌混和<br>は1回以内) |
|                                      | コナジラミ類<br>アブラムシ類 | 1g/株<br>(但し、10a 当り<br>30kg まで) |      |         |            |                          |
|                                      | アブラムシ類           | 20kg/10a                       | 生育期  | 5 回以内   | 株元散布       |                          |
| 花き類・<br>観葉植物<br>(きく、<br>ガーベラを<br>除く) | コナジラミ類<br>アブラムシ類 | 1g/株<br>(但し、10a 当り<br>30kg まで) | 定植時  | 1 回     | 植穴<br>土壌混和 | 5 回以内<br>(土壌混和<br>は1回以内) |
|                                      | アブラムシ類           | 20kg/10a                       | 生育期  | 5 回以内   | 株元散布       |                          |
| つつじ類                                 | ツツジグンバイ          | 6kg/10a                        | 発生初期 | 2 回以内   | 散布         | 5 回以内                    |
| いぐさ                                  | イグサシンムシガ         | 3～6kg/10a                      |      |         |            | 2 回以内                    |