

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	—	カメシ類	2000 倍	60～150L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1 回以内、本田 での散布、空 中散布、無人 航空機散布は 合計 3 回 以内)
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000 倍					3 回以内
		アブラムシ類 カメシ類	2000 倍					3 回以内
未成熟 とうもろこし	—	アブラムシ類 カメシ類	2000 倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	3 回以内 (育苗期の 株元散布及び 定植時の土壤混 和は合計 1 回以内、散布 及び定植後の 株元散布は 合計 2 回以内)
ムキゲヒレアブラムシ カメシ類		2000～ 3000 倍						3 回以内
とうもろこし (子実)		アブラムシ類						2000 倍
ピーマン	—	アブラムシ類	3000 倍	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壤 約 1.5～4.0L) 当り 0.5L	鉢上時 又は 定植時	1 回	灌注	3 回以内 (育苗期の株 元散布及び定 植時の土壤混 和は合計 1 回 以内、定植時 の土壤混和は 1 回以内、散 布及び定植後 の株元散布は 合計 2 回以内)
		コナジラミ類	2000～ 3000 倍					3 回以内
		アザミウマ類 カメシ類	2000 倍					3 回以内
トマト ミニトマト	—	コナジラミ類	100 倍	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壤 約 1.5～4.0L) 当り 0.5L	鉢上時 又は 定植時	1 回	灌注	5 回以内 (培土混和及び 灌注は合計 1 回以内、育苗 期の株元散布は 1 回以内、定植 時の土壤混和は 1 回以内、散 布及び定植後 の株元散布は 合計 2 回以内)
			2000～ 3000 倍					3 回以内
		カメシ類	2000 倍					3 回以内
なす	—	コナジラミ類	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	3 回以内 (育苗期の株 元散布及び定 植時の土壤混 和は合計 1 回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 2 回以内)
		アブラムシ類	3000 倍					3 回以内
		アザミウマ類 カメシ類	2000 倍					3 回以内
とうがらし類	—	アブラムシ類	3000 倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	4 回以内 (育苗期の株元 散布及び定植 時の土壤混和は 合計 1 回以内、 定植後の株元 散布は 1 回 以内、散布は 2 回以内)
		コナジラミ類	2000～ 3000 倍					4 回以内
		アザミウマ類 ナスミハエ	2000 倍					4 回以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
とうがらし(葉)	—	コナジラミ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
		アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで			
アザミウマ類		2000倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L			定植前日～定植時	1回	灌注
コナジラミ類								
かぼちゃ		アブラムシ類	100倍					
きゅうり		アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
		アザミウマ類 ウリハムシ カメムシ類	2000倍					
すいか		アブラムシ類	2000～3000倍		収穫7日前まで			4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
		コナジラミ類	2000～3000倍		収穫3日前まで			3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
メロン		アブラムシ類	3000倍					
うり類 (漬物用)	アザミウマ類	2000倍	収穫前日まで		3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)			
	コナジラミ類 アザミウマ類							
にがうり	コナジラミ類	2000倍	収穫前日まで		4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)			
ズッキーニ	アブラムシ類							
	まくわうり							3000倍

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
きゅうり(葉)	—	アブラムシ類 コナジラミ類	3000 倍	100～300L /10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
きゅうり(花)					収穫 前日まで			
ブロッコリー		アブラムシ類	2000～ 3000 倍		セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5～4.0L) 当り 0.5L			
		アブラムシ類 コナガ	100 倍					
はくさい		アブラムシ類	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (定植時の土壌 混和及び灌注は 合計 1 回以内、 散布は 2 回 以内)
		キスジノミハムシ ダイコンハムシ	2000 倍					
キャベツ		アブラムシ類	2000～ 3000 倍					
		アブラムシ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	50～ 100 倍					
レタス 非結球レタス		アブラムシ類	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (は種前の培土 混和は 1 回 以内、育苗期の 株元散布、定植 時の土壌混和 及び育苗トレイへ の灌注は合計 1 回以内、 散布は 2 回 以内)
		ハスモンヨトウ	50 倍					
非結球あぶらな 科葉菜類 (チンゲンサイ、 畑わさびを 除く) かぶ	アブラムシ類	3000 倍	100～300L /10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (は種時の 土壌混和は 1 回以内、散布 は 2 回以内)	
	キスジノミハムシ	2000 倍						
チンゲンサイ	アブラムシ類	3000 倍						2000 倍
	キスジノミハムシ	2000 倍						
畑わさび	アブラムシ類	3000 倍	2000 倍	畑育苗期	3 回以内	3 回以内		
わさび	アブラムシ類 ナトビハムシ	3000 倍						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
だいこん	—	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	5回以内 (は種時の播種土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
		ダイコンハムシ	2000倍					
		キスジノミハムシ	1000倍					
クレソン		アブラムシ類	3000倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L	収穫3日前まで	3回以内	1回	3回以内
ねぎ		アサミウマ類	2000倍		定植前日～定植時	2回以内		
アサミウマ類 ハモグリハエ類 シロイチモジヨトウ タネハエ ネギコガ		50倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫14 日前まで	株元 灌注			
クロハネキノコバエ類		1000倍						
アサミウマ類 ハモグリハエ類 トビイロヒョウタンゾウムシ		400倍	0.4L/m ²					
にら		ネギアサミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)
	ネギアサミウマ アブラムシ類							
	クロハネキノコバエ類	1000倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫14 日前まで	1回	株元 灌注		
わけぎ	アサミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内 (定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	
	アサミウマ類 ハモグリハエ類	400倍	0.4L/m ²	生育期 但し、 収穫14 日前まで	1回	株元 灌注		
アスパラガス	コナジラミ類 アサミウマ類 カメムシ類 ジユウシホシクビナガハムシ	2000倍	100～800L/10a	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
らっきょう	アサミウマ類							
さとうきび	アブラムシ類 カンジャコハネナガカメムシ サトウキビチビアサミウマ		100～300L/10a	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)		

2021 年 12 月 22 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数		
にんじん	—	アブラムシ類	2000 倍	100~300L /10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、生育期の株元灌注は 1 回以内、散布は 2 回以内)		
		トビイロヒョウタンゾウムシ クロバネキノコバエ類	400 倍	0.4L/m ²	生育期 但し、収穫 21 日前 まで	1 回	株元 灌注			
セルリー	—	アブラムシ類	2000 倍	100~300L /10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (定植時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)		
ほうれんそう		アブラムシ類 ウリハムシモトギ	3000 倍		収穫 3 日前まで			3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)		
しゅんぎく		アブラムシ類			収穫前日まで			3 回以内 (は種時及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布は 2 回以内)		
だいず		カメムシ類 ダイズサヤタマハエ			2000 倍			収穫 7 日前まで	3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計 2 回以内)	
		フタスジヒメハムシ	3000 倍							
あずき		アブラムシ類			3 回以内				3 回以内	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげ、未成熟そらまめを除く)		アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000 倍						2 回以内	
えだまめ		カメムシ類 ダイズサヤタマハエ アブラムシ類 ハモグリバエ類	3000 倍		2 回以内				3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計 2 回以内)	
		フタスジヒメハムシ								
未成熟ささげ		アブラムシ類 ハモグリバエ類								2 回以内
さやいんげん		アブラムシ類 ハモグリバエ類 コナジラミ類 カメムシ類	2000 倍						収穫前日まで	3 回以内 (株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)
さやえんどう 実えんどう		アブラムシ類 ハモグリバエ類 ウラナミシジミ カメムシ類								
未成熟そらまめ	アブラムシ類 ハモグリバエ類 カメムシ類	収穫 7 日前まで		2 回以内						
しょうが	クロバネキノコバエ類			3 回以内 (株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)						
オクラ	アブラムシ類 フタデンミドリヒメコバエ		収穫前日まで							

2021 年 12 月 22 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	—	ワタアブラムシ	2000 倍	100～300L /10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
かんしょ		コナジラミ類 アブラムシ類			収穫 3 日前まで	1 回		1 回	
せり	水田	アブラムシ類			収穫 7 日前まで	3 回以内		3 回以内	
せり (水耕栽培)	ガラス室等の施設				収穫 3 日前まで				
すいぜんじな	—	アブラムシ類			2 回以内	収穫前日まで		2 回以内	2 回以内
モロヘイヤ						アザミウマ類			
なんてん(葉)		アブラムシ類							
ふき		コナジラミ類				収穫 7 日前まで			3 回以内 (土壌表面散布は1回以内、 散布は 2 回以内)
りんご	—	アブラムシ類 キンモンホソガ シンクイムシ類 ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類			200～700L /10a	収穫前日まで		3 回以内	3 回以内
もも ネクタリン		アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類 モモチョッキリゾウムシ							
おうとう		オウトウショウジョウバエ カメムシ類	2 回以内	2 回以内					
なし		アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 チュウゴクナシキシラミ	3 回以内	3 回以内					
かき		カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノハタムシガ アザミウマ類	4 回以内 (塗布は 1 回以内、 散布は 3 回以内)						
ぶどう	フタテンヒメヨコバイ	3000 倍	3 回以内	3 回以内 (塗布は 1 回以内)					
	カメムシ類 ブドウトラカミキリ	2000 倍							
	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～ 2000 倍							

2021 年 12 月 22 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数						
かんきつ	—	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～ 2000 倍	200～700L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内						
		ゴマダラカミキリ	1000 倍											
アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 ミカンハエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーセカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノトリヒメヨコバイ アオハハコロモ		2000 倍												
アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類														
キウイフルーツ		カメムシ類	1000～ 2000 倍											
マンゴー		チャノキイロアザミウマ	2000 倍						200～400L /10a	摘採 7 日 前まで	2 回以内	株元 灌注	5 回以内	
びわ		カメムシ類 ヒワキジラミ												
あけび(果実)		カメムシ類												収穫 14 日 前まで
オリーブ														収穫前日 まで
オリーブ(葉)			2000 倍						200～400L /10a	摘採 7 日 前まで	2 回以内	株元 灌注	5 回以内	
茶	チャノホソガ チャノトリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ コミカンアブラムシ		200～400L /10a	摘採 7 日 前まで	2 回以内									
てんさい	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	収穫 7 日 前まで	移植前	1 回	灌注	3 回以内 (灌注は 1 回 以内、散布は 2 回以内)						
	カメノコハムシ	1000～ 2000 倍												
	カメノコハムシ テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100～ 200 倍	5L/ペーパー ポット 6 冊 (2.5L/m ²)											
かんきつ (苗木)	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100～ 240 倍	6L/ペーパー ポット 6 冊 (3L/m ²)											
かんきつ (苗木)	ミカンハモグリガ	50 倍	100mL/株	育苗期	5 回以内	株元 灌注	5 回以内							
アマランサス(茎葉) しそ(花穂) しそ科葉菜類 (しそ、バジルを 除く)	アブラムシ類	3000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内							

2021 年 12 月 22 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数		
しそ	—	アブラムシ類 ウリハムシトキ	3000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (定植時の土壌 混和は 1 回 以内、散布は 2 回以内)		
バジル しよくようほおずき 食用ミニバラ 食用カーネーション 食用パンジー 食用金魚草 食用レニア 食用なでしこ 食用プリムラ 食用エキザカム 食用せんいちこう		2 回以内								
食用コスモス		2 回以内								
食用ぎく		アブラムシ類 コナジラミ類			2000～ 3000 倍	1L/m ²	収穫 7 日 前まで	5 回以内	散布	3 回以内 (定植時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 2 回以内)
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)		アブラムシ類 コナジラミ類			2000～ 3000 倍					1L/m ²
きく		アブラムシ類 コナジラミ類			2000～ 3000 倍	100～ 300L/10a	発生初期	5 回以内	散布	5 回以内 (株元灌注は 2 回以内)
		カメムシ類			2000 倍	100～ 700L/10a				
樹木類 (つつじ類、 つばき類を 除く)		ケムシ類			2000 倍	100～ 700L/10a	発生初期	5 回以内	散布	5 回以内
つつじ類		ツツジゲンバイ ケムシ類				100～300L /10a				
つばき類		ケムシ類				100～ 700L/10a				
いぐさ		イグサシムシガ			100 倍	0.5～2L/樹 (但し、220L /10a まで)	2 回以内	株元 灌注	2 回以内	
いね科牧草		アブラムシ類			1000 倍	100～150L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	2 回以内
水田作物、 畑作物 (休耕田)		ヨシ、オギ、 ススキ、セイタカ アワダチソウ等 の多年生 雑草が優 占している 休耕田			2000 倍	60～150L /10a	—			

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
かき	コナカイガラムシ類	20～40g /樹	発芽前 ～ 発芽期	1 回	本剤 1g 当り水 1mL の割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。	4 回以内 (塗布は 1 回以内、散布は 3 回以内)
ぶどう			幼果期まで 但し、収穫 30 日前まで			3 回以内 (塗布は 1 回以内)
	クビアカスカシバ	40g/樹				