

サンリット水和剤（第20980号）

2021年12月22日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シメコゾールを 含む農薬の 総使用回数
りんご	褐斑病 黒星病 赤星病 うどんこ病 モニリア病 斑点落葉病	2000～ 4000倍	200～700 L/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病	4000倍					
ネクタリン	灰星病	2000～ 4000倍		収穫前日 まで			
もも		2000～ 4000倍					
小粒核果類		2000～ 4000倍					
おうとう	幼果菌核病 炭疽病	2000倍	100～300 L/10a	収穫14日 前まで	2回以内	2回以内	
いちご	うどんこ病	2000～ 4000倍					
しょうが	白星病	1000倍  24倍	3.2 L/10a	収穫7日 前まで	5回以内	無人航空 機による 散布	5回以内
しそ	さび病	5000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
茶	炭疽病 もち病	2000～ 4000倍	200～400 L/10a	摘採7日 前まで	1回		1回
さくら	幼果菌核病	2000倍	200～700 L/10a	展葉始期 ～展葉期	3回以内		3回以内