

MICベフラン液剤25 (第22541号) 1/2

2020年6月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	イノキサゾンを 含む農薬の 総使用回数				
麦類 (小麦を 除く)	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1000倍	60～ 150L/10a	根雪前	2回以内	散布	3回以内 (種子への 処理は1回 以内、散布は 2回以内、出 穂期以降は1 回以内)				
	紅色雪腐病	10倍	乾燥種子 1kg 当り 30～50mL	は種前	1回	塗沫処理					
		5倍	乾燥種子 1kg 当り 15～25mL								
	紅色雪腐病 条斑病 斑葉病 網斑病 ふ枯病 なまぐさ黒穂病	原液	乾燥種子 1kg 当り 3～5mL			種子吹き 付け処理 又は 塗沫処理					
	斑葉病	250～ 500倍	—			10～30分 間種子浸漬					
	なまぐさ黒穂病	1000～ 2000倍									
小麦	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1000倍	60～ 150L/10a			根雪前	3回以内 (但し、 出穂期以降 は1回以内)	散布	4回以内 (種子への 処理は1回 以内、散布 及び無人航空 機散布は合計 3回以内、 出穂期以降は 1回以内)		
	うどんこ病 葉枯症			収穫14日 前まで							
	赤かび病										
	紅色雪腐病	250倍	25L/10a	根雪前							
		10倍	乾燥種子 1kg 当り 30～50mL	は種前	1回	塗沫処理					
	5倍	乾燥種子 1kg 当り 15～25mL									
	紅色雪腐病 条斑病 ふ枯病 なまぐさ黒穂病	原液	乾燥種子 1kg 当り 3～5mL			種子吹き付 け処理又は 塗沫処理					
	なまぐさ黒穂病	1000～ 2000倍	—			10～30分 間種子浸漬					
りんご	腐らん病	500～ 1000倍	200～ 700L/10a			休眠期	6回以内 (但し、 開花期 以降 散布は 3回以 内)	散布	8回以内 (液剤及び 水和剤は 合計6回以内 (開花期以降 は3回以内)、 塗布剤は 2回以内)		
	モニリア病 腐らん病 黒星病 うどんこ病	1000倍				展葉期					
	黒星病	1500倍		収穫前日 まで							
	斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 すす点病 すす斑病	1500～ 2000倍									
	紫紋羽病	250倍			—	苗木植付前				—	根部浸漬

MICベフラン液剤25 (第22541号) 2/2

2020年6月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	イナクジンを含 む農薬の 総使用回数		
ぶどう	晩腐病	250～ 500倍	200～ 700L/10a	休眠期	1回	散布	3回以内 (休眠期は 1回以内、 生育期は 2回以内)		
	褐斑病 黒とう病 つる割病	250倍							
	黒とう病 枝腫病	1000倍		収穫60日 前まで	2回以内				
なし	黒斑病	250倍		休眠期	1回		5回以内 (塗布剤は 2回以内、 液剤は 1回以内)		
	黒星病	1000倍		収穫後～ 休眠期					
もも	縮葉病	250～ 500倍		休眠期	3回以内 (休眠期は 1回以内)				
みかん	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2000～ 3000倍		200～ 700L/10a	3回以内		3回以内		
	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病)	2000倍							
かんきつ (みかん、ゆ ずを除く)	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2000～ 3000倍			収穫前日 まで			2回以内	2回以内
	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病)	2000倍							
	ゆず	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2000～ 3000倍						
貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病) 幹腐病		2000倍							
マルメロ かりん	腐らん病	1500倍	展葉期		4回以内 (但し、 開花期以降 散布は 3回以内)	4回以内 (開花期以降 は3回以内)			
アスパラガス	茎枯病	1000倍	100～ 300L/10a		収穫終了後 (冬期まで)	5回以内		5回以内	
りんどう	花腐菌核病 葉枯病 黒斑病	1500倍	100～ 700L/10a	—	8回以内	8回以内			