



# 水稲用一発除草剤

農林水産省登録 第16664号

# クサホープ® D 粒剤

■有効成分:ジメタメトリン...0.20% ピラゾレート...6.0% プレチラクロール...1.5%  
■人畜毒性:普通物\*  
クサホープは三井化学アグロ(株)の登録商標です



アゼナ



アメリカアゼナ

## SU抵抗性雑草に...!!

(スルホニルウレア)



コナギ



ホタルイ

### きれいな水田になります!!



表層はく離



アオミドロ



## 三井化学アグロ株式会社

\*写真は実際と異なることがあります。

# クサホープ®D粒剤

※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

■有効成分:ジメタメトリン・・・0.20% ピラゾレート・・・6.0% プレチラクロール・・・1.5% ■人畜毒性:普通物※

## クサホープ®D粒剤は、非SU(スルホニルウレア)系除草剤です。

いつも残る問題の、アゼナ、アメリカアゼナ、ホタルイ、コナギなどの他、アオミドロ、表層はく離にも優れた効果があります。

### ●使用基準

2016年12月1日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数	ピラゾレートを含む農薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 および マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ヒルムシロ アオミドロ・藻類による表層はく離 オモダカ(東北、北陸、九州) ウキクサ(近畿・中国・四国)	移植後3日～ ノビエ2葉期 ただし、移植後 30日まで	砂壤土 ～埴土	3kg /10a	1回	湛水 散布	全域の 普通期および 早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内

### ●使用時期 (通常使用の場合)

◎SU抵抗性雑草(アゼナ、ホタルイ、コナギ等)の発生地域では登録の範囲内のできるだけ早く使用してください。  
◎雑草の発消長にあわせ、適期に散布してください。



### ●試験成績

1997年 社内試験(滋賀県)

●:極大 ○:大 △:小 ×:効果なし

#### SU抵抗性 アゼナ(+4日処理)

薬剤名	効果
クサホープ®D粒剤 3kg/10アール	●
SU系B粒剤 3kg/10アール	△

#### SU抵抗性 ホタルイ(+3日処理)

薬剤名	北海道産	滋賀県産(感受性)
クサホープ®D粒剤 3kg/10アール	●	●
SU系Aフロアブル 500ml/10アール	×	●

### ●注意事項

- 本剤は雑草の発生前から発生始期に有効なので、ノビエの2葉期(北海道は1.5葉期)までに時期を失しないように散布してください。なお雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果のふれが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ミズガヤツリ、オモダカは発生前から発生始期まで、ウリカワ、ヘラオモダカは発生前から2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、ウキクサ、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期ですが、できるだけ早く散布してください。
- 苗の植付が均一になるように、代かきをていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は特に代かきをていねいに行ってください。
- 散布に当たっては、水の出入りをとめて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm程度)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。
- 北海道の泥炭質土壌の水田で使用する場合、ウリカワには効果が劣ることがあるので、ウリカワ多発田では使用しないでください。

- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないよう適期に散布してください。
- 下記のような条件では初期生育の抑制やクロロシスが生じるおそれがあるので使用をさけてください。特にこれらの条件と梅雨明けなどによる散布時又は散布後数日間の異常高温が重なると、初期生育の抑制が顕著になるので、そのような条件下では使用しないように注意してください。
  - ①砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(1日の減水深が2cm/日以上)
  - ②軟弱な苗を移植した水田
  - ③極端な浅植の水田
- 活着遅延を生ずるような異常低温が予測されるときは、初期生育の抑制などが生ずるおそれがあるので、このような条件下での使用に際しては、県の防除方針に基づき、病害虫防除等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫

- 防除等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の指示を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記載しましょう。

\*本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

\*本印刷物は2016年12月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

### 取扱い



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1日本橋ダイヤビルディング  
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>