

組み合わせ

絶妙!

効果

安定!

ピカット

殺菌剤

フロアブル





ピカソット

殺菌剤 フロアブル

農林水産省登録：第23785号

有効成分：ペンチオピラド……8.0%
メバニピリム……10.0%

人畜毒性：普通物※
※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

作用点の異なる **2成分の混合** により、耐性菌の発生を抑えます。



- 果実や葉の汚れが少なく、使いやすいフロアブル剤です。
- 浸達性、残効性があります。
- 収穫前日まで使用できます。

適用病害および使用方法

2018年7月25日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペンチオピラド を含む農薬の 総使用回数	メバニピリム を含む農薬の 総使用回数
きゅうり	褐斑病 菌核病 黒星病	1000倍	100~300ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
トマト ミニトマト	灰色かび病 うどんこ病							
	葉かび病							
なす	灰色かび病 うどんこ病 すすかび病							
すいか メロン	うどんこ病 つる枯病							
いちご	灰色かび病 うどんこ病 黒斑病	3回以内						

使用上の注意事項 ●使用前によく振ってから使用してください。●薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用点の異なる薬剤との輪番で使用してください。●空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。●本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

保管 ●直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

本製品は農業用殺菌剤であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。
本印刷物は2018年7月25日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、すべての事例に当てはまるものではありません。

アフェットは三井化学アグロ(株)の登録商標 フルピカはクミアイ化学工業(株)の登録商標

取扱い

