

手軽で便利、500グラム処理!

直播水稻専用 初期除草剤

ジカマック


500グラム粒剤



湛水直播(表面は種同時散布)

- 10アールあたり500グラムで処理でき、作業性に優れます。
- SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、アゼナなど)に優れた効果を発揮します。

ジカマック500グラム粒剤の散布時期と体系処理の例 (鉄コーティング表面は種の場合)



農林水産省特許農薬原料
生産・製造技術「WCS」
に搭載された農薬です。

ジカマックは三井化学アグロ(株)の登録商標

ジカマック[®] 500グラム粒剤

有効成分
 ピラゾレート.....10.0%
 ベンゾピシクロン.....2.0%
 メタゾスルフロン.....0.60%
 人畜毒性：普通物*
 *「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を指す。



特長

- 10アールあたり500グラムで処理でき、作業性に優れます。
- SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、アゼナなど)に優れた効果を発揮します。

■適用雑草および使用方法

(2020年5月13日現在の登録内容)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法
直播水稻	一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、 ヒルムシロ、セリ	は種時	500g/ 10a	本剤：1回 ピラゾレート：2回以内 ベンゾピシクロン：3回以内 メタゾスルフロン：2回以内	は種同時散布機で施用
		は種直後～ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで			湛水散布又は 無人航空機による散布

■除草効果の安定のために

除草剤の有効成分は水に溶けて広がるので、**処理後は速やかに入水してください。**



■は種時の田面の最適な硬度の確認

①ゴルフボールを田面より1mの高さから落とす。



②田面からゴルフボールの高さが5～10mmになる硬さが最適。

は種同時散布には...

こまきちゃん



散布ボリューム目安表 (CS-30) 1kg目皿をご使用ください。

株間 (cm)	ボリューム (500g/10a)	
	6条	8条
14	1.7	2.2
16	1.9	2.5
18	2.0	2.7
21	2.2	3.2
24	2.3	3.6
30	2.9	4.5

※本目安表はあくまでも目安です。作業環境(スリップロス、気温、湿度等)により誤差が生じますので、使用時に必ず目盛の微調整を行ってください。

は種後の無人航空機による散布も可能です!



⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、時期を失ないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレグが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。各雑草の散布適期は以下の通りです。
 - ノビエ...1.5葉期まで
 - ホタルイ...1葉期まで
 - ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ...発生始期まで
- 散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布してください。は種時に通常の湛水状態より水を落とす場合は、散布後速やかに入水し通常の湛水状態(水深3cm程度)にしてください。少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3cm程度)を保ち、田面を露出させないように注意してください。散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ってください。
 - ① 散布は使用機種の使用基準に従って実施してください。
 - ② 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③ 事前に薬剤の物理性に合わせて散布装置のメタリング度を調整してください。
 - ④ 散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、散布装置のインペラの回転数を調整し、圃場の端から5m離れた位置から圃場内に散布してください。
 - ⑤ 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 後処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失ないように散布してください。
- 砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)では、薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。

- 本剤はその殺草特性からいさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の養蚕にはかからないようにしてください。
- 空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 散布田の水田水を他の作物に灌水しないでください。
- 河川、湖沼、地下水等を汚染しないよう、水管理を適正に行ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■保管

- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。また、吸湿しやすいので開封後は堅く口を閉じ、長期間の保存はさけてください。

アルテアはメタゾスルフロンの登録です。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。● 防除日誌を記録しましょう。

*本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。

*本印刷物は2020年5月13日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

JMG1G01D



三井化学アグロ株式会社
 東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
 ホームページ <https://www.mitsui-agro.com/>