

登録番号 第 16759 号

トレボン<sup>®</sup>粒剤

●水面施用でイネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイなど水稻の重要害虫に効果を発揮します。

特長： ●いぐさ・れんこん・さとうきび・畑わさび・わさびにもご使用になれます。

●粒剤ですので、周辺へ飛散しにくい薬剤です。

●稲発酵粗飼料（WCS）用稲にも使用できます。

有効成分	エトフェンプロックス（化管法第1種）・・・1.5%	包装	2kg×10
性状	褐色細粒	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

## 【適用害虫及び使用方法】

2021年04月21日付内容

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
稲	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ イネゾウムシ イネカメグサリバエ イコノ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	2～3 kg/10a	収穫21日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	コメイチュ第1世代	3kg/10a				
さとうきび	ハリガネシ類	9kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	1回
れんこん	イネクイムシ	3kg/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
いぐさ	イグサシロムシガ	2kg/10a	-	3回以内	散布	3回以内
畑わさび	ナビハムシ	3kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	2回以内 (植付時の土壌混和は1回 以内、散布は1回以内)
	ナビハムシ ワサビリイロサシゾウムシ		収穫14日前 まで		散布	
わさび	ナビハムシ	3kg/10a	畑育苗期 ただし、植付時	1回	植溝土壌混和	2回以内 (植付時の土壌混和は1回 以内、散布は1回以内)
			畑育苗期		散布	

## 使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- (2) 本剤を本田で使用する場合、湛水状態（湛水深3～5cm）でまきむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも3～4日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないように注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。

- (3) 本剤を使用したわさびの苗を畑地からわさび田に移植する場合には、使用した農薬がわさび田の水系に持ち込まれないよう、わさびの苗に付着した土を十分に洗い落とすこと。
- (4) 蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにすること。
- (5) 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別すること。
- (6) ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - 1) ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
  - 2) 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (7) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

#### 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- (1) 誤食などのないよう注意すること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用すること。作業後は手足、顔等を石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする。

#### 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- (1) 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
- (2) 水産動植物（甲殻類、冷水魚）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。養殖池等周辺での使用はさけること。
- (3) 散布後は水管理に注意すること。
- (4) 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

#### 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法ではその該当がない。

#### 貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。