

畑の雑草を、 不法侵入で 訴えたい。

アサガオ はザクサ液剤で、しっかり防除!!

迷惑な
雑草に!!

非選択性茎葉処理除草剤

ザクサ
液剤

畦畔より侵入してくる アサガオ類は早めに防除!!

走り雨が新緑をより鮮やかに映し出す季節を迎え、作物が大きく成長する時期となりました。しかしこの時期は雑草の成長にとっても絶好のタイミングです。

そのなかで特に厄介なのがアサガオ類です。アサガオは、奈良時代もしくは平安時代に、薬用として渡来したとされ、現在も、観賞用だけでなく、漢方薬としても使われています。

しかし、観賞用に栽培されていたアサガオが、野生化し作物の収量・品質の低下をまねいたり、農機故障の原因となるなど、今では問題雑草になっています。

そんなアサガオ類に不法侵入される前に、ザクサ液剤でしっかり防除しましょう。

防除の ポイント

- ザクサ液剤を200倍で散布しましょう。
- ザクサ液剤をアサガオの株元まで散布することで、先端までしっかり枯らします。

■ アメリカアサガオ(ザクサ200倍での除草効果)



散布前



散布3日後



散布7日後



散布14日後

● アメリカアサガオ

ヒルガオ科の一年生雑草で、サツマイモの仲間です。花が次々と咲き、種子で増えます。全体に荒い短毛が生え、茎はつるとなり長さ数mになります。原産地は熱帯および温帯アメリカで気温が高いほど生育がよく、温暖化によって分布域や被害の拡大が予想されます。発生が多いのは関東以西ですが、東北地方でも確認されています。生育密度が高くなると、つるが作物等にかからまり、防除が困難になってしまいます。4月から10月まで長期にわたり開花・結実するので、見つけたらすぐの防除を心がけてください。



大豆畦間の雑草は 素早く枯らし、長く押さえる!!

大豆は雑草が繁茂すると収量・品質が低下してしまう為、長く雑草を抑えることが重要となります。ザクサ液剤は、大豆の問題雑草であるアサガオ類、アレチウリなどに除草効果が高く、素早く枯らし、枯らした状態を保つ「抑草効果」の長い除草剤です。乗用管理機の畦間散布装置を使用して大豆を傷つけず、畦間除草の省力化とスピードアップが可能です。

雑草を素早く枯らす

■ ザクサ液剤の大豆の畦間除草効果


【処理薬量】500mℓ/100ℓ/10a(200倍)



おすすめの散布適期


散布適期は大豆3葉期頃～開花終期までです。

大豆へ飛散しないように散布してください。雑草の草丈が大豆より高くなる前までに散布すると効果的です。



乗用管理機による除草は 吊り下げノズルの使用がお勧め!

- ザクサ吊り下げノズルは各農機メーカーから販売されている畦間散布装置に装着が可能です。
- 噴角を80°~160°に調整が可能です。そのため、ノズル位置が低くても畦の側面に散布することができます。
- 薬剤が泡状に噴出され、散布跡が白く残ります。薬液が雑草に付着しやすく、飛散しにくいタイプの噴口です。散布状況を確認しながら作業できます。



ザクサ吊り下げノズル
[メーカー]株式会社麻場



ぶどうの園内除草に ザクサ液剤を勧めています!

びほく農協 ぶどう生産部会 部会長
中山喜祐さん

JAびほくは、岡山県中北部に位置し水稲・果樹・野菜・畜産と幅広く栽培、飼育している農村地帯です。特に、全国有数の生産量を誇るピオーネは全国初の色彩選別カメラを導入した選果場を整備し全国にお届けしています。ピオーネをはじめとする農産物はJAびほくオンラインショップや直売所でもお買い求めいただけます。



取材
協力

JAびほく 営農生産部 園芸課

〒716-0045 岡山県高梁市中原町1383 TEL0866-22-4593
<http://www.ja-bihoku.or.jp/>



色彩選別カメラを導入したぶどう選果場



全国生産第1位岡山のピオーネ



ピオーネ出荷ラインのようす